

带状疱疹予防ワクチン「シングリックス」の開始

高齢者の带状疱疹予防に有効な新しいワクチン「シングリックス」がGSK社より発売されました。すでに米国、カナダ、ドイツで市販され、带状疱疹と带状疱疹後神経痛(PHN)の高い予防効果が確認されています。しかし接種後の痛みや胃腸症状など一過性に副反応が出る欠点があります。

シングリックスはワクチン供給本数に制限があるため、受診予約の他にワクチンの予約が必要です。当院では1月30日から接種を開始します。

なお、従来の带状疱疹予防ワクチン「水痘ワクチン」は受診予約のみで、ワクチンの予約は不要です。

	带状疱疹と神経痛(PHN)の予防効果	年齢、回数	通常価格	名古屋市公費助成 3/1以降,50才以上
シングリックス	带状疱疹予防 90~98% 带状疱疹後神経痛予防 85~100%	50才以上 2回目は2か月以上~6か月未満 ³⁾ 。	1回 21,000円 (税込)	1回 10,800円 (税込)
水痘ワクチン	51.3% PHN 66.5%	1回 1才以上	7,500円 (税込)	50才以上 4,200円 (税込)

1) シングリックス 臨床成績, GSK

2) IASR Vol. 39 p141-142: 2018年8月号, 国立感染症研究所

3) 仮に1回目を1月1日に接種したら、2回目は3月1日~6月30日に接種できる。7月1日は不可。

シングリックス接種後7日間に報告された副反応の発現率と持続日数(中央値)

	頻度(%)		持続日数(中央値)	
	全体	グレード3	全体	グレード3
疼痛	78.0	6.4	3.0	1.0
発赤	38.1	2.9	3.0	2.0
腫脹	25.9	1.0	3.0	1.0
筋肉痛	40.0	4.5	2.0	1.0
疲労	38.9	4.5	2.0	1.0
頭痛	32.6	2.9	2.0	1.0
悪寒	23.5	3.7	1.0	1.0
発熱	17.9	0.3	1.0	1.0
胃腸症状	13.0	1.0	2.0	1.0

出典: シングリックス臨床成績, GSK

※グレード3は、日常生活に支障がある程度の症状

公費助成は一生で水痘1回またはシングリックス2回のみ。水痘ワクチンで公費助成を受けた場合、シングリックスの公費助成を受けることはできない。自費での過去の接種はカウントしない。

備考:

シングリックスは副反応が強いワクチンです。接種後3日程度、接種部の痛みの他、腹痛や嘔吐、下痢などの副反応が見られる場合があります。

名鉄病院 予防接種センター

2020/1/29